




Cenozoico

- Q2a Depósitos aluvionares: areia, cascalho, silte, argila e turfa.
- N1dl Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas: laterita com conceções ferruginosas, níveis de cascalho, horizontes mosqueados e latossolos.

Mesozoico

Bacia dos Parecis

- K2ut Formação Utiariti: arenitos fino a médio, de cores vermelho, amarelo e branca, com estratificação cruzada de pequeno porte, localmente com seixos esparsos.
- K2sn Formação Salto das Nuvens: conglomerado polimítico, arenito lítico grosso, arenito fino vermelho, argilito, argilito calcífero e marga calcífero.
- C2cb Formação Fazenda da Casa Branca: arenito médio a grosso, amarelo a vermelho, com estratificação de médio porte, conglomerado, argilito e folhelhos.
- SDpb Formação Pimenta Bueno: folhelho micáceo, marrom, físsel e laminado, arenito creme a esverdeado, siltito, diamictito e paraconglomerado, argilito e folhelhos.

Mesoproterozoico

- MP1δsl Anortosito Serra Lobo: anortosito equigranular e porfiroide, anortosito protoclástico.
- MP1δJ Gabro Juína: olivina gabro, norito, diabásio, troctolito-olivina gabro, granodiorito e hornblenda granodiorito.

Suíte Serra da Providência (1532 - 1573 Ma, U-Pb)

- MP1γp Fácies granito *rapakivi*: hornblenda-biotita granito, biotita sienogranito, anfibólio-biotita granito, biotita granito e biotita gnaiss.
- MP1γpp Fácies granito *rapakivi* porfirítico
- MP1γpm Fácies microclina granito *rapakivi*: granito gnaiss milonítico, biotita granito *rapakivi* cisalhado.
- MP1γpgn Fácies hornblenda granada granito milonítico, granada monzogranito gnaiss.

Paleoproterozoico

Grupo Roosevelt (1740 - 1762 Ma, U-Pb)

- PP4rms Unidade metavulcanossedimentar: metariolito, metandesito, quartzo andesito, riolito, metarenito, metarcósio, metargilito, metasiltito, xisto, filito, metatufo e formação ferrífera.

Legenda

- Cidade
- ▲ Kimberlito
- ~ Drenagens



